

CHELAI



CHELAI

CHELAI es un fungicida preventivo con amplio espectro de acción. Actúa por contacto y tiene un gran poder de penetración en profundidad.

CHELAI interfiere el mecanismo de respiración de los hongos e inhibe la actividad de las enzimas sulfhídricas bloqueando el crecimiento y desarrollo micelial.

CHELAI estimula la vegetación, favorece la cicatrización de heridas de pedrisco y tiene una buena persistencia.

Aplicaciones autorizadas

ARBUSTOS ORNAMENTALES: Alternaria, Botritis, Fialofora*, Fusarium*, Heterosporium y Mildiu.

BERENJENA: Alternaria, Antracnosis, Botritis, Fusarium* y Mildiu.

ENDIBIA, ESCAROLA Y LECHUGA: Alternaria, Antracnosis, Fusarium* y Mildiu.

FRESAS: Botritis.

FRUTALES DE HUESO: Abolladura, Cicatrización de heridas de granizo, Cribado, Chancro y Monilia.

FRUTALES DE PEPITA: Cicatrización de heridas de granizo y Monilia.

GARBANZO, GUISANTES PARA GRANO, HABAS PARA GRANO Y JUDÍAS

VERDES: Antracnosis, Botritis, Fusarium* y Mildiu.

OLIVO: Repilo.

ORNAMENTALES HERBÁCEAS: Alternaria, Botritis, Fialofora*, Fusarium*, Heterosporium, Mildiu y Verticilium.

PATATA: Alternaria, Antracnosis y Mildiu.

PUERRO Y TOMATE: Alternaria, Antracnosis, Botritis, Fusarium* y Mildiu.

ROSAL: Antracnosis.

VID: Black-rot, Botritis, Cicatrización de heridas de granizo, Excoriosis y Mildiu.

*Tratamientos dirigidos al cuello de las plantas.

Dosis y formas de aplicación

Aplicar en pulverización foliar normal a la dosis de 250 a 300 gramos por 100 litros de agua (0,25 – 0,3 %) recubriendo bien toda la vegetación.

En viñedo y cicatrización de heridas aumentar la dosis a 300 a 400 gramos por 100 litros de agua (0,3 – 0,4%).

Precauciones

- En manzano no aplicar durante la floración. En Golden Delicious no aplicar hasta 6 semanas después de la floración.
- Contra Repilo del olivo tratar en primavera.
- Contra la Excoriosis de la vid tratar en el momento del desborre.
- No usar en pera Blanquilla ni Mantecosa de Anjou.
- A temperaturas elevadas son sensibles la vid joven y las cucurbitáceas.
- No mezclar con caldo bordelés, aceites ni productos de reacción alcalina.
- Deben transcurrir 2-3 semanas antes o después de un tratamiento con aceite.

Plazo de seguridad

Entre el último tratamiento y la recolección debe transcurrir un mínimo de:

- **21 días** en endibia, escarola, fresas, judías verdes, lechuga y viñedo.
- **10 días** en el resto de cultivos.

FICHA TÉCNICA

CHELAI

| | |
|-----------------------------------|--|
| PRODUCTO | Fungicida preventivo de contacto y con un gran poder de penetración. |
| MATERIA ACTIVA | Folpet: 50% p/p |
| FORMULACIÓN | Polvo mojable (WP) |
| NOMBRE QUÍMICO | N-(triclorometiltio) ftalimida |
| GRUPO QUÍMICO | Ftalamidas |
| FORMULA QUÍMICA | C ₉ H ₄ Cl ₃ N O ₂ S |
| ASPECTO | Polvo impalpable de color beige |
| pH (10% en agua) | 8,0 – 9,0 |
| DENSIDAD APARENTE | 0,240 – 0,340 g/ml |
| SOLUBILIDAD | Dispersable en agua |
| TOXICIDAD AGUDA | DL ₅₀ (oral en rata): 18.000 mg/kg DL ₅₀ (dérmica en conejo): 9.000 mg/kg |
| CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA | Nocivo (Xn) Peligroso para el medio ambiente (N) |
| RIESGOS MEDIOAMBIENTALES | Mamíferos: A Aves: A Peces: C. Muy peligroso para peces. Abejas: Compatible con abejas. |
| NÚMERO REGISTRO | 21.283 |
| ENVASES | 1 y 5 kg |

LAINCO, S.A.

Pol. Ind. Can Jardí - Avda. Bizet, 8-12 - 08191 Rubí (Barcelona)

Tel. 93 586 20 15 - Fax 93 586 20 16

E-mail: lainco@lainco.es - <http://www.lainco.es>