

SPANTING



SPANTING

Herbicida selectivo, sistémico y remanente

SPANTING es un herbicida selectivo, sistémico, de amplio espectro contra malas hierbas anuales en pre y postemergencia precoz.

SPANTING es absorbido por vía radicular y, en menor medida, por las hojas. Interfiere la función clorofílica. La duración de la actividad residual en el suelo, cuando se aplica a 1,5 kg/ha, es de unos 3 meses.

Aplicaciones autorizadas

SPANTING está autorizado contra malas hierbas anuales en preemergencia o postemergencia precoz en cultivos de:

ALFALFA

CAÑA DE AZUCAR

CEBADA DE CICLO LARGO

ESPÁRRAGO

GLADIOLO

PATATA

TOMATE

TRIGO DE CICLO LARGO

Entre las malas hierbas que controla podemos destacar las siguientes: *Amaranthus, Avena fatua, Chenopodium, Cyperus, Digitalia, Lolium, Papaver rhoeas, Poa annua, Polygonum, Rumex, Senecio, Sonchus, Taraxacum, etc.*

Dosis y forma de aplicación

Aplicar en pulverización a baja presión con un gasto mínimo de caldo de 400 l/ha a las dosis que se indican a continuación:

- ALFALFA: aplicar durante el reposo invernal, antes de la brotación, en cultivos de más de 2 años a la dosis de 0,75 kg/ha.

- CAÑA DE AZÚCAR: aplicar en preemergencia o postemergencia del cultivo, pero después de preparados los caballones a la dosis de 0,75 kg/ha
- CEBADA DE CICLO LARGO Y TRIGO DE CICLO LARGO: aplicar en preemergencia o postemergencia del cultivo a partir del estado de 3 hojas a la dosis de 0,1 kg/ha
- ESPÁRRAGO: aplicar antes de la brotación, después de preparados los caballones a la dosis de 0,75 kg/ha
- GLADILO: aplicar en preemergencia del cultivo a la dosis de 0,75 kg/ha
- PATATA: aplicar en preemergencia del cultivo a la dosis de 0,75 kg/ha
- TOMATE: aplicar en preemergencia inmediatamente después de la siembra, en preplantación o en postransplante, cuando esté bien enraizado a la dosis de 0,75 kg/ha. En preemergencia dosis de 0,15 kg/ha en mezcla con Napropamida 45% a 2-3 kg/ha,

Precauciones

- No utilizar en terrenos muy arenosos.
- En suelos ricos en materia orgánica la degradación del producto es más rápida, por lo que la duración de la acción residual será menor.
- No utilizar sobre las variedades de patata: 'Draga', 'Jaerla', 'Kora', 'Maris', 'Narew', 'Nysa', 'San' y 'Vivax'.
- En tomate, si se aplica en preemergencia en mezcla con Napropamida, no se pueden cultivar hasta pasados, al menos 12 meses: alfalfa, cereales, espinaca, lechuga, maíz, remolacha y sorgo.
- No cultivar especies sensibles hasta pasados 4 meses desde la realización del tratamiento (apio, batata, cebolla, crucíferas, cucurbitáceas, fresa, frutales, girasol, guisante, judía, lino, maíz, platanera, remolacha, tabaco y vid, entre otras).

Plazo de seguridad

No procede fijar un plazo de seguridad.

FICHA TÉCNICA

SPANTING

PRODUCTO	Herbicida selectivo, sistémico, contra malas hierbas anuales en pre y postemergencia precoz.
MATERIAS ACTIVAS	Metribuzina: 70% p/p (700 g/kg)
FORMULACIÓN	Polvo mojable (WP)
NOMBRES QUÍMICOS	4-amino-6- <i>ter</i> -butil-3-metiltio-1,2,4-triazin-5-ona
FORMULAS QUÍMICAS	C ₈ H ₁₄ N ₄ O S
ASPECTO	Polvo fino de color beige-blanco.
OLOR	Picante fuerte
pH (1% en agua)	5,0 – 6,0
DENSIDAD APARENTE	0,250 – 0,350 g/ml
SOLUBILIDAD	Dispersable en agua
TOXICIDAD AGUDA	DL ₅₀ (oral en rata): 1.000 mg/kg DL ₅₀ (dérmica en conejo): > 20.000 mg/kg
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	Nocivo (Xn) Peligroso para el medio ambiente (N)
RIESGOS MEDIOAMBIENTALES	Mamíferos: A Aves: A Peces: C. Muy peligroso para peces. Abejas: compatible con las abejas.
NUMERO REGISTRO	24.178
ENVASES	35 g, 100 g y 1 kg (2 x 500 g)

LAINCO, S.A.

Pol. Ind. Can Jardí - Avda. Bizet, 8-12 - 08191 Rubí (Barcelona)

Tel. 93 586 20 15 - Fax 93 586 20 16

E-mail: lainco@lainco.es - <http://www.lainco.es>