

Fungicida

INFORME TÉCNICO

LAINCOBRE M



LAINCOBRE M

LAINCOBRE M es un fungicida preventivo y de contacto para el control de un gran número de hongos endoparásitos causantes de enfermedades foliares en todo tipo de cultivos. La combinación sinérgica del mancozeb con cobre potencia su acción contra Bacteriosis.

LAINCOBRE M inhibe varios procesos vitales del metabolismo de los hongos. Este forma de acción "multipunto" impide la aparición de razas resistentes.

LAINCOBRE M ha demostrado su gran eficacia y seguridad para el control del aguado de los cítricos, alternaria, antracnosis, bacteriosis, cercospora de la remolacha, chancros, mildiu, monilia, moteado, negrilla, rabia del garbanzo, repilo del olivo, roya, septoria, etc.

Aplicaciones autorizadas

AJOS, CEBOLLA, CHALOTE, HIERBAS AROMÁTICAS, LECHUGA, LÚPULO Y PUERRO: Mildiu.

APIO: Mildiu y Septoria.

BRASICAS, RÁBANO Y ZANAHORIA: Alternaria y Mildiu.

CÍTRICOS: Aguado, Alternaria, Bacteriosis y Negrilla.

CUCURBITÁCEAS, GUI SANTES VERDES: Antracnosis y Mildiu.

ESCAROLA: Mildiu y Roya.

FRUTALES DE HUESO: Chancro y Monília.

FRUTALES DE PEPITA: Monília y Moteado.

GARBANZO: Rabia.

JUDÍAS PARA GRANO: Alternaria, Antracnosis y Roya.

JUDÍAS VERDES: Alternaria y Antracnosis.

OLIVO: Repilo.

PATATA: Alternaria, Antracnosis y Mildiu.

REMOLACHA AZUCARERA: Cercospora.

SOLANÁCEAS (Berenjena, Pimiento y Tomate. No Tabaco): Alternaria, Antracnosis, Míldiu y Septoria.

VID: Antracnosis y Míldiu.

Dosis y formas de aplicación

Aplicar en pulverización foliar normal recubriendo bien toda la vegetación a la dosis de 400 a 600 gramos por 100 litros de agua (0,4 a 0,6%)

En REMOLACHA AZUCARERA aplicar de 4 a 6 kg/ha

Precauciones

- No aplicar en las variedades de peral Blanquilla ni Mantecosa, ya que puede resultar fitotóxico.
- Compatible con la mayoría de productos fitosanitarios, excepto polisulfuros alcalinos, caldo bordelés preparado en campo, productos borados, aceites y líquidos emulsionables. En caso de duda, consultar a la empresa.

Plazo de seguridad

Entre el último tratamiento y la recolección debe transcurrir un mínimo:

- 3 días en cucurbitáceas y solanáceas (excepto patata).
- 15 días en ajos, cebolla, cítricos, chalote, garbanzo, hierbas aromáticas, lúpulo, olivo, patata, rábano, vid y zanahoria.
- 21 días en apio, escarola, guisantes verdes, judías para grano, judías verdes, lechuga y puerro.
- 28 días en brasicas, frutales de hueso, frutales de pepita y remolacha azucarera.

FICHA TÉCNICA

LAINCOBRE M

PRODUCTO	Fungicida preventivo de amplio espectro de acción
MATERIA ACTIVA	a) Mancozeb: 17,5 p/p b) Oxicloruro de cobre (expresado en Cu): 22% p/p
FORMULACIÓN	Polvo mojable (WP)
NOMBRES QUÍMICOS	a) Etilenbisditiocarbamato de zinc y manganeso b) Oxicloruro de cobre
GRUPOS QUÍMICOS	a) Ditiocarbamatos b) Inorgánicos
ASPECTO	Polvo impalpable de color azul.
pH (1% en agua)	6,5 – 7,5
DENSIDAD APARENTE	0,327 - 0,427 g/ml
SOLUBILIDAD	Dispersable en agua
TOXICIDAD AGUDA	DL ₅₀ (oral en rata): 5325 mg/kg DL ₅₀ (dérmica en conejo): 6896 mg/kg
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	Nocivo (Xn) Peligroso para el medio ambiente (N)
RIESGOS MEDIOAMBIENTALES	Mamíferos: A Aves: A Peces: B. Mediana peligrosidad para peces.
NÚMERO REGISTRO	22.717
ENVASES	1 kg y 5 kg

LAINCO, S.A.

Pol. Ind. Can Jardí - Avda. Bizet, 8-12 - 08191 Rubí (Barcelona)
Tel. 93 586 20 15 - Fax 93 586 20 16
E-mail: lainco@lainco.es - <http://www.lainco.es>